


Рисунок 1. Алгоритм оценки риска ЖКК и защиты ЖКТ при терапии ОАК





Примечание. * - следует рассмотреть возможность ограничения применения у пациента, получающего ОАК антиагрегантов, нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов, тромболитических препаратов, НПВС, СИОЗС, СИОЗСН, хинидина, дронедафона, амиодарона, ритонавира, кетоконазола, кларитромицина, эритромицина, флуконазола, нелфинавира, индинавира, вориконазола, кетоконазола, саквинавира, дарунавира, ритонавира, ифавиренца, а также некоторых продуктов питания и БАД - зеленый чай; розмарина экстракт; апельсиновый сок; черный перец; экстракты мяты, абрикоса, клубники, апельсина. хрен обыкновенный, гинкго, имбирь, чеснок, малина, пиретрум девичий, куркумин грейпфрутовый сок, эвкалипт.

ОАК – оральные антикоагулянты, ЛС – лекарственные средства, БАД – биологически активные добавки, НПВС – нестероидные противовоспалительные средства, СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗСН – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.

Рисунок 2. Стратегии защиты желудочно-кишечного тракта при терапии оральными антикоагулянтами в сочетании с антитромбоцитарными препаратами